Автор: Administrator 31.10.2011 13:24 -



Бруцеллез — заболевание, которому в первую очередь подвержены домашние животные, но к нему восприимчивы многие звери и дикие птицы. Особенностью бруцеллеза является то, что он всегда протекает хронически и не имеет резко выраженных признаков.

Из диких животных к бруцеллезу восприимчивы сайга, лоси, северные и пятнистые олени, маралы, волки, лисицы, песцы, суслики, еноты, зайцы, а из диких птиц — воробьи, голуби, фазаны.

Возбудителями заболевания являются особые бактерии — бруцеллы: абортус бовис — вызывает инфекционный аборт у коров; мелетеизис — вызывает заразный аборт у овец и коз; суис — вызывает аборт у свиней; рангифер — возбудитель бруцеллеза у северных оленей. Бруцеллы бовис и мелетеизис опасны и для людей.

Установлено, что из диких животных бруцеллой суис часто заражаются зайцы, бруцелла бовис в 1967 г. обнаружена у лося. Дикие птицы (особенно воробьи) восприимчивы к бру-целлам мелетензис и суис. Возникает вопрос: как могут заражаться бруцеллезом свиней зайцы? По-видимому, они заражаются им, когда забегают на фермы или дворы, где имеются больные животные.

Дикие птицы (воробьи, голуби), живущие в хозяйствах, не благополучных по бруцеллезу, не только заражаются сами, но и разносят заразу по лесу. Большую роль в распространении бруцеллеза могут играть и дикие хищники, которые забегают в населенные пункты и растаскивают падаль с плохо оборудованных скотомогильников.