



Сведений о размерах и весе акклиматизированных у нас енотов очень мало, и они не дают правильного представления об изменчивости этих признаков. Приведенные выше цифры даны по американским источникам и характеризуют изменчивость вида на его родине в целом.

Ареал. Естественный ареал занимает Северную Америку и Центральную Америку на юг до зоны Панамского канала. Северная граница ареала довольно сложна — начинаясь на р. Св. Лаврентия в самих ее низовьях (около Квебека), она тянется по югу провинций Квебек и Онтарио (Канада) к озеру Нипигон (немного севернее Верхнего), переходит на побережье Верхнего и идет по нему до его западной оконечности. Отсюда она направляется на юго-западную оконечность озера Виннипег и далее вогнутой линией поднимается далеко на север к западной части озера Атабаска.

Отсюда граница резко опускается к юго-юго-западу — к юго-западному углу штата Альберта. Далее граница принимает весьма причудливую форму. Она дает огромный мыс, как бы петлю, к югу, обходя значительную (восточную) часть Скалистых гор и Большой Бассейн и спускаясь до 40° и даже 35° с. ш. По областям, тяготеющим к Тихому океану, то ближе к нему (южнее), то сильно удаляясь (севернее), граница выходит на север к юго-восточному углу Британской Колумбии и, несколько поднимаясь к северо-западу, выходит к побережью Тихого океана на уровне северной оконечности острова Ванкувер.

Автор: Administrator
30.12.2010 22:36

Указание на то, что енот появился (был высажен?) на Багамских островах в 1932(Нитхаммер, 1963) основано на недоразумении — *P. maynardi* с острова Нью-Провиденс был описан еще в 1898 г.