Автор: Administrator
28.01.2011 13:56

На Дальнем Востоке еноты (черные) выпускались на остров Петрова близ Владивостока и в ряде мест Приморского края (южная половина), но все выпуски были неудачны — животные погибали (на карту эти места не нанесены; Абрамов, 1963). В Средней Азии енотов выпускали в Джелалабадской области Киргизии в орехово-яблоневых лесах, южных — обращенных к Ферганской долине — склонов Тянынаньских хребтов в Арсланбобе (севернее Джелалабада).

Они отмечались здесь в районе Ачи (между Арсланбобом и Джелалабадом) и в районе Базар-Кургана (к западу — северо-западу от Джелалабада; высадки 1936 и 1952 гг. Новиков, 1956). На январь 1963 г. здесь «практически енотов нет». Еноты были высажены в горные леса долины р. Пскем (у кишлака Сиджак к северо-востоку от Ташкента между Угамским и Пскемским хребтами — крайние западные отроги Тянь-Шаня; Салихбаев и др., 1963).

По одним данным (Салихбаев и др., 1963), енот здесь удержался и несколько расширяет область своего обитания, по другим— «результаты... неясны» и оценки его состояния и дальнейшей судьбы в литературе слишком оптимистичны. В целом попытки акклиматизации енота в Средней Азии неудачны или результаты их на 1963 г. неясны, и, видимо, их следует оставить.

В Восточном Закавказье (Азербайджан) высадки енота в лесную полосу, связанную с южным склоном Главного Кавказского хребта, начавшиеся в 1937 г., были успешны и привели к созданию довольно значительной и устойчивой популяции (ежегодная добыча 1000—1500 особей), занимающей один довольно значительный участок, и отдельные очаги, отдаленные от него.

Главный ареал тянется полосой от района г. Белоканы (немного восточнее Лагодехи) по так называемым Закатало-Нухинским лесам (Закатало-Нухинская долина) до г. Нухи и

далее до района Исмаиллы, т. е. на протяжении более 200 км. Это самый большой в СССР очаг обитания вида, откуда берется материал для дальнейшего расселения.