Автор: Administrator
28.03.2011 18:54

Враги, болезни, паразиты, смертность, конкуренты, движение численности. К врагам енота относят волка, рысь, филина. В местах обитания енота в СССР эти хищники редки и не наносят ему существенного урона. Данных о болезнях и смертности нет. В Закавказье конкурентами енота в добывании пищи оказываются бурый медведь, барсук, выдра, лесная и каменная куницы, шакал, кошки, кабан, благородный олень и соня-полчок (Руковский, 1951, 1953).

О движении численности данных нет. В Киргизии за 13 лет численность енотов увеличилась лишь в 5 раз, а в Азербайджане за 9 лет — в 100 раз.

Полевые признаки. Сумеречно-ночная активность сильно затрудняет непосредственные наблюдения над енотами. Их присутствие может быть установлено по признакам обитаемости дупел (следы когтей на коре, отполированность отверстия дупла и т. п.) и по следам их лап на влажной почве по берегам водоемов. На следу передних лап хорошо видны отпечатки пяти длинных когтистых пальцев. Следы задних лап напоминают в сильно уменьшенном виде следы задних лап бурого медведя. Они более вытянуты в длину, чем у барсука.

Практическое значение. Енот-полоскун — ценный пушной зверь. Шкуры его используются преимущественно для изготовления зимних мужских пальто на меху. Ввиду того, что область его возможного распространения, очевидно, должна быть ограничена зонами смешанных и широколиственных лесов, практическое значение енота

как пушного зверя не может быть значительным. Больше оно может быть в южных районах, где объектов пушных заготовок мало. При заселении енотами заболоченных угодий они могут наносить ущерб молодняку ондатры. Для взрослых ондатр и водоплавающих птиц еноты опасности не представляют, так как поедают только подранков. Еноты полезны уничтожением вредных в лесном и сельском хозяйстве насекомых.